

Aus der Universitäts-Frauenklinik zu Königsberg Pr.
Direktor: Prof. Dr. F. v. Mikulicz-Radecki

Lane Medical Library

Schwangerschaftsdauer und Reifegrad bei Zwillingen
unter Zugrundelegung der Zwillingsgeburten an der
Universitäts-Frauenklinik Königsberg Pr. von 1910-1932

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Albertus-Universität zu Königsberg Pr.

vorgelegt von

Max Dieke

Königsberg Pr.
1935.

Referent: Prof. v. Mikulicz-Radecki.

Meinen Eltern in Dankbarkeit gewidmet!

Die Bearbeitung des Themas soll von dem Endziel geleitet sein, einen Nutzen für die Praxis zu erhalten. Besonders für die Indikationsstellung und für die Möglichkeiten operativer Eingriffe kann eine möglichst genaue Kenntnis über die Beziehungen zwischen Dauer der Schwangerschaft und Größe der Kinder bei Zwillingsgeburten von Wichtigkeit sein. Man denke dabei an Indikationen durch ein enges Becken und an Eingriffe, die wegen Raumeinge im Uterus speziell bei Zwillingen, nötig werden können.

Bei Einlingen wissen wir über diese Fragen durch die Arbeiten von Zangemeister und Labhardt bereits Bescheid. Ueber Zwillinge wissen wir nur allgemein, daß die Schwangerschaft häufig früher beendet ist als bei Einlingen, und daß Zwillingskinder mit mäßiger Entwicklung bessere Aussicht zum Weiterleben haben als gleichentwickelte Einlinge.

Ferner streift das Gebiet auch forensische Fragen und rein wissenschaftliche: ob die Zwillinge, die Föten, wie Parasiten jeder nach eigener Kraft im Mutterleibe leben und dabei rücksichtslos auf Kosten der Mutter wachsen, welches Verhältnis zwischen Mutter und Zwillingsföten besteht, und welches die physiologischen Grenzen der Schwangerschaftsdauer sind.

In der medizinischen Literatur finden sich nur wenige Arbeiten, die das Thema berühren. Lüdi, der dies Thema direkt anschnidet, sagt sogar, daß er in der ganzen Literatur keine Arbeit über diese Frage finden können. In den „Berichten der gesamten Geburtshilfe und Gynäkologie“ fanden sich Berichte über die Arbeiten von Liebmann⁹⁾ und Essen-Möller¹⁰⁾, in denen sie sich mit Zwillingen beschäftigt haben. Keine dieser Arbeiten wirft die Frage nach Schwangerschaftsdauer und Reifegrad auf. Einige Zahlen über die Reife aus diesen Arbeiten sollen später herangezogen werden. Tauber¹¹⁾ und Kühnemann¹²⁾ bringen Tabellen über die von ihnen bearbeiteten Zwillingsgeburten. Diese sind, da Angaben

über Länge und Gewicht der Kinder gemacht waren, nach den angegebenen Monaten ihrer Schwangerschaftsdauer geordnet und weiter unten in die Tabelle C eingesetzt worden.

Für die Schwangerschaftsdauer für Einlinge fand man am häufigsten 271 Tage, vom ersten Tag der letzten regelmäßigen Regel angerechnet.³⁾ Gemäß der geltenden Schulregel, werden zum ersten Tag der letzten regelmäßig aufgetretenen Regel sieben Tage hinzugezählt und drei Monate abgezogen.

Bei der Begriffslegung „Reifegrad“ für Einlinge ging man von der Beobachtung aus, daß Kinder, die am 271. Tage nach dem ersten Tag der letzten regelmäßigen Regel, dem am häufigsten gefundenen Geburtstermin, geboren wurden, neben der Fähigkeit weiterzuleben noch eine ganz bestimmte Körperentwicklung erreicht haben. Als Erkennungsmaß für diesen Grad der Körperentwicklung ist die Länge als am wichtigsten befunden worden, weil sie am konstantesten ist. Daneben sind das Körpergewicht und einige Kopfmaße zu beachten, für die folgende Maße als Norm gelten. Nach Zangemeister⁶⁾ beträgt die Länge eines reifen Einlings 50 cm und das Gewicht 3250 g. Als untere Grenzwerte werden 48 cm Länge und 3000 g Gewicht und als obere Grenzwerte 52 cm Länge und 3500 g Gewicht angegeben. Der Kopfumfang im Planum fronto-occipitale beträgt 34 cm. Nach Frank⁸⁾ soll bei einem reifen Kind dieser Umfang nie unter 32 cm liegen. Der gerade Kopfdurchmesser von der Glabella bis zum Hinterhaupt mißt 12 cm, der große Querdurchmesser zwischen beiden Scheitelbeinhöckern 9,5 cm und der kleine Querdurchmesser zwischen den Schläfen 8 cm.

Wir sind gewohnt, diese für Einlinge allgemein gültigen Werte auch für Zwillinge zu gebrauchen und bei der Frage nach der Reife oder Unreife die Länge des größeren der beiden Zwillingskinder als Maßstab zu nehmen. Auf diesem Standpunkt steht auch Lüdi¹⁾ am Ende seiner Arbeit. Wir werden aber zu einem anderen Schluß kommen.

Zur genaueren Bearbeitung des Themas wurde das gesamte Krankenmaterial an Hand der Krankenblätter rückläufig durchstudiert. Ihre Einzelheiten wurden ausgezogen und zu einer Kartothek geordnet. In den Jahren von 1910—1932 wurden an der Universitätsfrauenklinik 374 Mehrlinge geboren, darunter waren 7 Drillinge, die zum Schluß mit aufgeführt werden sollen. Die Angaben der Kranken-

blätter der ersten fünf Jahre gingen nicht sehr auf die Einzelheiten ein, genügten aber, um in die Arbeit mit einbezogen zu werden. Besonders über die Termine der letzten Regel und der zu erwartenden Niederkunft waren nur ungefähre Zeiten innerhalb der Monate angegeben. Etwa seit 1915 fanden sich genauere anamnestische Angaben. Da es bei der Bearbeitung der Fälle darauf ankommt, aus den Erfahrungen der Praxis die Nutzenanwendung auf die Praxis zu ziehen, so sind auch diese Fälle mit nicht ganz genauen Angaben hinzugenommen worden. Denn es ist in der Praxis ebenfalls oft nicht möglich, die Termine auf genaue Tage festzulegen. Andererseits fanden sich in fast allen Jahrgängen doch in einzelnen Fällen genaue Angaben über die Empfängniszeit. Diese 28 Fälle sollen weiter unten gesondert aufgeführt werden.

Unter Abzug der 28 Fälle mit genau bekanntem Konzeptionstermin und der 7 Drillingsfälle bleiben noch 338 Fälle, die als wesentlicher Grundstock für die Bearbeitung des Themas dienen sollen.

Bezüglich der Reifezeichen fanden sich in den Krankenblättern nur kurze Angaben. Selten werden Lanugobeharrung und Fingernägel beschrieben. Neben der Länge und dem Gewicht werden Kopfmaße angegeben. Es wird fast immer ein Urteil über Reife oder Unreife abgegeben. Nur in 31 Fällen, die weiter unten zusammengekommen sind, ist das Urteil nicht eindeutig.

Eine Durchsicht der 338 Geburten zeigt, daß bei 135 Geburten = 39,94 % beide Kinder als reif bezeichnet sind, und 9 Geburten, bei denen nur ein Kind als reif bezeichnet ist. Unter diesen 135 Geburten ist in 13 Fällen das größere Kind nicht 48 cm lang. Es ist daraus zu ersehen, daß bei der Beurteilung der Kinder die untere Grenze der Länge für Einlinge unterschritten worden ist. Wie weit dies berechtigt ist, wird sich später zeigen. Nach Abzug dieser 13 Fälle bleiben von den 338 Zwillingsgeburten nur 122 = 33,4 % übrig, wo das größere Kind mindestens 48 cm lang ist und somit, nach dem Maß für Einlinge gemessen, die Kinder als reif zu bezeichnen sind. In der Kartothek finden sich aber 80,8 % lebendgeborene Kinder.

Vergleicht man die geringe %zahl der als reif bezeichneten Kinder mit der hohen %zahl der lebendgeborenen Kinder, so drängt sich der Gedanke auf, daß für reife Zwillinge die untere Grenze der Länge tiefer liegen muß.

Entsprechend wird auch der Mittelwert der Länge von 50 cm für das jeweilig größere Kind zu hoch sein, da er nur in 71 Fällen = 21 0/0 erreicht wird.

Der Mittelwert des Gewichtes von 3250 g ließ sich nur in 33 Fällen = 10 0/0 für die größeren Kinder feststellen, so daß auch der Normwert des Gewichtes tiefer liegen muß. Die normale Schwangerschaftsdauer von 271 Tagen wird von Zwillingen nur in 49 Fällen = 14,4 0/0 erreicht. Diese geringen Prozentsätze für Länge, Gewicht und Schwangerschaftsdauer lassen darauf schließen, daß die für Einlinge geltenden Werte, selbst wenn sie auf das jeweilig größere Kind angewandt werden, zu hoch sind, um als Normwerte zu gelten.

Um zu einem solchen für Zwillinge zu gelangen, ist unter Benutzung aller 338 Geburten zunächst Statistik I angelegt worden. Dazu ist für die einzelnen Fälle der Kartothek nach den Angaben über die letzte Regel ein Geburtstermin gemäß der Schulregel errechnet worden. Bei den Fällen der ersten fünf Jahre, wo die letzte Regel nur ungefähr angegeben war, wurden für den Anfang des Monats der 5., für die Mitte des Monats der 15. und für das Ende des Monats der 25. Tag eingesetzt. Nach dem sich ergebenden Unterschied zwischen dem errechneten und tatsächlichen Geburtstermin sind dann sämtliche Fälle, ohne Rücksicht auf Reife oder Unreife der Kinder, so geordnet worden, daß die Geburten, die früher als errechnet erfolgten, mit minus, die, die später als errechnet erfolgten, mit plus-Vorzeichen versehen und zu Gruppen zu je fünf Tagen zusammengefaßt wurden. Nur bei fünf Geburten stimmte der errechnete mit dem tatsächlichen Geburtstermin überein. Sechs Gruppen mit nur 54 Geburten überschritten den errechneten Geburtstermin und 15 Gruppen mit 284 Geburten lagen darunter.

In der Statistik erhalten die senkrechten Reihen die Durchschnittswerte bzw. Zahlen für die Angaben der Kopfreihe und zwar:

- in den Reihen 1—5 über Stand und Geburtenzahl der Mütter, die allerdings für die Berechnung nicht verwertet worden sind,
- in den Reihen 6—9 über Durchschnittswerte der zeitlich erstgeborenen Kinder nach Länge, Gewicht, Kopfumfang und Kopfdurchmesser,

Statistik I

Termin	Mädchen	I. Para	II. Para	III. Para	XIII. Para	Länge	I. Kind Gewicht	Kopf- umfang	Gerader	I. Quer	II. Quer	Q ₃	+o	tot	reif	V	Anzahl	Länge	II. Kind Gewicht	Kopf- umfang	Gerader	I. Quer	II. Quer	Q ₃	+o	tot	reif	V	Durchschnitt		Kopf- umfang	reif	reif	Summe	
+74/31	2	2	?	0	2	50 ₅	2990	35 ₈	11 ₈	9	8	3	1	2	5	3	5	50	2818	34 ₃	11	9 ₁	8 ₁	4	1	1	4	2	50 ₂₅	2901	35 ₅	1		9	
+30/26	1	2			1	50 ₃₈	3150	34 ₁	10 ₈	8 ₈	7 ₈₈	2	1		3	2	3	50 ₁₇	3130	34 ₁	11 ₁	8 ₈	7 ₇	1	2	1	2	1	50 ₂₅	3140	34 ₁	1		5	
+20/16	3	3	1	2	5	45 ₈	2363	33 ₄	10 ₄	8 ₇	7 ₃	4	2		1	3	6	45 ₇₅	2332	32 ₉	10 ₈	8 ₁	7 ₁	3	3	2	1	3	45 ₇₈	2347	33 ₁₅	10		2	
+15/11	4	3	5	0	2	49 ₃	3051	34 ₅	11 ₆	9 ₂	8 ₄	5	8		8	9	13	49 ₃	2861	33 ₇	11 ₂	9 ₃	7 ₈	7	6	3	7	3	49 ₃	2956	34 ₁₅	11	1	16	
+10/6	2	0		0	5	48 ₉	2950	33 ₇	10 ₀₅	8 ₀₁	7 ₄	9	7	2	7	4	11	49 ₀₅	2564	32 ₈	10 ₉	8 ₆	7 ₀₅	2	9	2	7	7	48 ₉₂	2657	33 ₂₅	8	2	16	
+5/1	4	9	1	1	2	49	3010	34	11 ₀₆	9 ₁	8 ₁	8	8	2	15	11	16	48 ₆	2930	34 ₂	11 ₂	9 ₁	7 ₃	6	10		13	5	48 ₃	2970	34 ₁	4	3	31	
0	1	2	?	0	4	47 ₈	2794	33 ₉	11 ₁	9	7 ₃	2	3	1	4	2	5	48 ₂	2802	33 ₆	11	9 ₁	8 ₅	1	4	1	5	3	48	2798	33 ₇₅	1		9	
-1/5	2	6	4	4	10	48 ₃	2870	34	11 ₂	9 ₃₃	7 ₅	8	10	1	12	7	18	49 ₃	2915	34	11 ₁	8 ₀	7 ₆	11	7		12	9	48 ₈	2892	34	12	5	29	
-6/10	2	10	9	5	6	49	2923	33 ₈	11 ₁	9 ₁₅	7 ₅	17	17	7	26	15	34	48 ₃	2912	34 ₀₃	11 ₃₇	9 ₀₁	7 ₆₃	12	22	5	30	19	48 ₉	2918	33 ₃₁	12		56	
-11/15	5	6	4	2	5	48 ₉₆	2898	33 ₅₈	11 ₀₄	8 ₉₂	7 ₆	8	10	1	14	9	18	48 ₁	2706	33 ₂₃	10 ₈₃	8 ₉₂	7 ₃₈	8	10	2	13	9	48 ₈₈	2802	33 ₄	9	5	32	
-16/20	8	13	8	4	5	47 ₄₁	2636	33 ₃₅	10 ₇₇	8 ₃₄	7 ₂	17	13	3	19	17	30	47 ₀₂	2484	32 ₉₆	10 ₈₃	8 ₇	7 ₂	14	16	3	19	13	47 ₂₁	2737	33 ₁₅	22	11	49	
-21/25	7	17	5	1	4	46 ₉₆	2479	32 ₇₇	10 ₈₄	8 ₉₂	7 ₁	15	17	2	18	14	28	47 ₀₃	2430	32 ₆₉	10 ₇₇	8 ₆₁	7 ₂	17	11	2	16	14	47 ₁₁	2458	32 ₇₃	22	10	44	
-28/30	9	15	4	2		46 ₄₈	2387	32 ₃₅	10 ₈₄	8 ₇	7 ₀₉	16	8	4	1	17	26	45 ₀₆	2218	31 ₃₈	10 ₈₃	8 ₃₇	6 ₈	13	12	5	9	4	45 ₇₇	2306	32 ₁₆	51	6	7	
	45	97	43	22	51	48 ₃₆	2808	33 ₇₈	11 ₀₁	0 ₀₁	7 ₅₅	110	101	25	128	113	213	48 ₃	2700	33 ₄₈	10 ₉	8 ₈₁	7 ₄₉	99	123	27	130	97	48 ₃	2828	33 ₉₆	164	44	305	
-31/35	4	9	6	0	5	45 ₇₅	2298	32 ₁₂	10 ₂₇	8 ₃₅	6 ₃₂	11	8		5	10	20	46 ₃₇	2399	32 ₀₅	10 ₁₅	7 ₈₅	7	10	10	1	5	10	46 ₅₈	2349	32 ₁₆	30	2	12	
-36/40	2	8	4	2	3	45 ₅	2153	31 ₄	10 ₈	8 ₄₁	6 ₇₃	8	9	2	2	12	17	44 ₂₅	2056	30 ₄₄	10 ₆	8 ₆	6 ₈	10	7	2	2	5	45 ₄	2110	30 ₉₂	30	2	6	
-41/45	7	11	4	1	0	13 ₃₇	1788	30	0 ₃₅	8 ₃	6 ₅	7	9	3	4	5	16	43 ₃₂	1916	30 ₂₈	10 ₂₅	8 ₂₅	6 ₃₈	7	9	2	2	11	43 ₅	1852	30 ₁₄	26		7	
-46/50	5	7	7	1	4	44 ₃	2071	31 ₂₅	10	8 ₄	7	9	10	2	4		19	43 ₇	2021	30 ₆	10 ₁₄	8 ₂₅	7	13	6	4	4		44	2046	30 ₉₁	30	1	9	
-51/55	2	4	2	1	1	43 ₅	1990	31 ₇	10	8 ₅	7	5	3	3		5	8	42 ₆	1851	32 ₁₇	10 ₀₁	8 ₃	6 ₈	4	4	5		3	43 ₀₅	1920	31 ₀₅	16			
-56/60	2	2	1	2	2	40 ₃₈	1336	28 ₃	9 ₁	6 ₃₆	5 ₃₃	1	6	5		2	7	41 ₈	1818	29 ₂₅	9 ₅	8 ₁	6 ₅	3	4	5		5	41	1577	28 ₃₇	14			
-61/65	2	3	2	2	1	41 ₇₅	1666	29 ₁	9 ₁	7 ₃₃	6 ₃₃	5	3	4		6	8	41 ₆₂	1570	29 ₃₈	9 ₆	7 ₇₃	6 ₅	4	4	5		2	41 ₆₈	1618	29 ₂₁	16			
-66/70	6	5	1			40 ₉₆	1683	29 ₂	0 ₆	8	6 ₄	4	2	1	1		6	42 ₃₃	1700	29 ₉	10 ₀₂	8	6 ₁	3	3	2		1	41 ₄₉	1691	29 ₅₅	10		2	
b -166	79	154	79	35	74	45 ₇₇	2320	32 ₁				11	13	17		13	24							8	15	15		11				336	49	341	
												171	165	62	143	166	338	45 ₃	2245	32				162	185	67	144	144							



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Statistik II

[illegible]

- in den Reihen 10 und 11 über Geschlecht der Kinder,
- in der Reihe 12 über Anzahl der totgeborenen oder im Laufe von 48 Stunden gestorbenen Kinder,
- in Reihe 13 über Anzahl der reifen Kinder,
- in Reihe 14 über Anzahl der Kinder, die größer als das zeitlich zweitgeborene sind,
- in Reihe 15 über Anzahl der Geburten,
- in den Reihen 16—23 über die zeitlich zweitgeborenen Kinder, wie in den Reihen 6—13,
- in Reihe 24 über Zahl der zweitgeborenen Kinder, die größer als die erstgeborenen sind,
- in den Reihen 25 -27 über Durchschnittswerte beider Kinder nach Länge, Gewicht und Kopfumfang,
- in Reihe 28 über Anzahl der unreifen Kinder,
- in Reihe 29 über Anzahl der Kinder, die nach dem später folgenden neuen unteren Grenzwerte für die Länge noch als reif — neureif — zu bezeichnen sind, und
- in Reihe 30 über die sich damit ergebende Gesamtzahl der reifen Kinder.

In den wagerechten Reihen kann man diese Angaben den Gruppen entsprechend ablesen. Nach der Gruppe 26/30 ist eine Zusammenzählung bzw. Durchschnittsberechnung für die Werte der Gruppen eingeschoben worden, die den 10. und 11. Schwangerschaftsmonat umfassen. Die vorletzte Reihe zeigt, daß in der Gruppe -71 -166 die Zahl der totgeborenen Kinder die der lebend geborenen übersteigt, d. h.: daß Zwillingskinder mit sieben einhalb Monaten Schwangerschaftsdauer zu 50⁰/₀ und mehr tot geboren werden.

Die Schlußreihe bringt die Endsummen und einige Durchschnittswerte der senkrechten Reihen für die Gruppen zwischen den Terminen +74/-70.

Wir finden für die ersten Kinder eine Durchschnittslänge von 45,77 cm und ein Durchschnittsgewicht von 2320 g, für die zweiten Kinder entsprechend 45,80 cm Länge und 2254 g Gewicht.

Zum Vergleich sollen jetzt die Durchschnittswerte aller Zwillinge nach den Arbeiten von Liebmann⁹⁾, Essen-Möller¹⁰⁾, Tauber¹¹⁾ und Kühnmann¹²⁾ gebracht werden. Es ergeben sich bei ihnen folgende Werte.

Liebm ann⁹⁾: 45 cm Länge, 2144 g Gewicht,
 Essen-Möller¹⁰⁾: 46,05 cm Länge, 2607 g Gewicht,
 Tauber¹¹⁾: 46,46 cm Länge, 2467 g Gewicht,
 Kühnemann¹²⁾: 45,25 cm Länge, 2365 g Gewicht.

Die Durchschnittswerte dieser insgesamt 1000 Geburten umfassenden Berechnungen ergeben folgende Zahlen: 45,75 cm Länge, 2373 g Gewicht. Diese Durchschnittswerte werden in der Statistik I von dem Mittelwert beider Kinder hinsichtlich der Länge in 62,1⁰/₀ der Fälle und hinsichtlich des Gewichtes in 58⁰/₀ der Fälle erreicht.

Eine Bewertung der ein- und zweieiigen Zwillinge wurde nicht vorgenommen, weil ein ziemlich hoher⁰/₀Satz, nämlich 33,7⁰/₀ der Geburten wohl gleichgeschlechtig waren, die Krankenblätter aber keine Angaben über die Eihäute brachten. Unter Mitbenutzung der Arbeiten von Tauber¹¹⁾, Jena und Kühnemann¹²⁾, Bonn, läßt sich folgende Tabelle in⁰/₀Zahlen über die die Ein- und Zweieiigkeit aufstellen:

	Kbg. eigene Statistik	Tauber	Kühn	Durch- schnitt
eineiige	5,75	10	22	12,58
gleichgeschlechtige ohne Angaben	33,7	22	10	30,9
zweieiige	60,55	41	68	56,52

In der Statistik II sind die 28 Fälle einzeln aufgeführt, bei denen der Empfängnistag in den Krankenblättern angegeben war. Sie sind wie in der Statistik I nach dem Unterschied des errechneten und des wirklichen Geburtstermins geordnet. Bei der Errechnung wurden vom Tag der Empfängnis drei Monate abgezogen. Nur acht Mütter waren verheiratet. Die Statistik zeigt in der zweiten senkrechten Reihe an wieviel die Geburten zu früh oder zu spät nach dem errechneten Termin erfolgten. Wir sehen, daß diese Termine sich von — 21 bis — 126 bewegen. Die Reihen III bis V geben das Geschlecht und die Maße der erstgeborenen Kinder an. In der 6. Reihe ist die Anzahl der unreifen und toten Kinder bezeichnet. In den Reihen 7 bis 10 wiederholen sich die Angaben von den Reihen 3 bis 6 für das zweitgeborene Kind. in der 11. Reihe sind die ein- und zweieiigen Kinder bezeichnet. Acht Fälle mit gleich

geschlechtigen Kindern sind mit einem Fragezeichen versehen, da über die Eihäute keine Angaben gemacht waren. Nach Analogie von Statistik I sind in den folgenden senkrechten Reihen die Geburten zu Gruppen von je fünf Tagen zusammengefaßt. Die Reihen 13 bis 15 bringen die Durchschnittsmaße der Länge, des Gewichtes und der Kopfmaße der Kinder, Reihe 16 gibt die Durchschnittslänge der größeren und Reihe 17 diejenige der kleineren Kinder an.

Die Durchschnittszahlen für alle Kinder dieser Statistik sind wie folgt: 48,17 cm Länge, 2727 g Gewicht, 33,16 cm Schädelumfang, 10,90 cm gerader-, 8,99 cm I. querer-, 7,4 cm II. querer Kopfdurchmesser. Die Werte für die als reif bezeichneten Kinder sind: 48,26 cm Länge, 2772 g Gewicht, 33,31 cm Schädelumfang, 11,1 cm gerader, 9,1 cm I. querer-, 7,31 cm II. querer Kopfdurchmesser.

In den Arbeiten von Tauber¹¹⁾, Jena und Kühnemann¹²⁾, Bonn, finden sich einzelne Angaben über die Länge und das Gewicht der Kinder, über die Reife, bzw. Unreife, über lebend- oder totgeborene Kinder und über den Schwangerschaftsmonat, in dem die Geburt eintrat. So konnten die Geburten zu Monaten zusammengefaßt und für Länge und Gewicht Durchschnittswerte errechnet werden.

In der Tabelle C

Tabelle C

Mo- nate	Jena	Zahl	0/ o reif	Kinder tot	Bonn	Zahl	0/ o reif	Kinder tot	Stati- stik I	Zahl	0/ o reif	Kinder tot	Stati- stik II	Durchschnitte p/o, greife
11 L G	Länge Gewicht				48 2680	4	4,5		48,62 2634	59	17	15	49,5 2775 48,71 2692	7,2
10 L G	48,75 2743	26	33	8	46,45 2580	52	58,4	5	48,11 2754	141	41	33	47,62 2695 47,73 2693	44,1
9 L G	48,1 2413	19	24	7	44,55 2050	28	31,5	7	44,55 2287	93	28	27	44,62 2156 45,45 2226	28
8 L G	46 2066	18	23	11	42 1419	5	5,6	3	41,04 1623	30	9	30	43,01 1703	12,5
7 L G	43 1712	14	18	19						9	3	17		7
6 L G	36 1150	6	2	4						6	2	7		1,2
		79		46 30% 30%		89		15 8,4% 8,4%		338		129 19% 19%	506 Geburten 46,23 2329	

sind in den senkrechten Hauptspalten A und B die aus den Arbeiten von Tauber¹¹⁾ und Kühnemann¹²⁾ errechneten Werte eingetragen worden, getrennt nach Anzahl der Geburten, prozentualer Verteilung aller reifen Kinder und Anzahl der toten Kinder. Die Spalten B und C bringen die Werte der Statistiken I und II, in Monaten zusammengefaßt. Die Spalte E enthält die Durchschnittswerte der Spalten A bis D für die einzelnen Monate. Die Monatswerte für Länge und Gewicht sind in den wagerechten Reihen abzulesen.

In dieser Tabelle C sind insgesamt 506 Geburten zusammengefaßt. Für sämtliche Geburten in den Monaten 8 bis 11 ergeben sich für die Länge und das Gewicht folgende Durchschnittswerte:

Länge 46,23 cm und Gewicht 2329 g.

In der Statistik I liegt der zahlenmäßige Mittelpunkt aller Geburten in der Gruppe —21 25 und zugleich sind die drei nach oben und unten benachbarten Gruppen zahlenmäßig die stärksten. Man kann daraus schließen, daß in diesem Bereich das normale Ende der Zwillingschwangerschaften zu suchen ist. Bei einem Vergleich mit den reifen Geburten zeigt sich allerdings, daß der zahlenmäßige Mittelpunkt der Geburtstermine aller als reif bezeichneten Kinder etwa 10 Tage höher liegt.

In der Statistik II liegt der zahlenmäßige Mittelpunkt aller Geburten um den Termin —20, derjenige der als reif bezeichneten Geburten bei —15. Beide Termine sind also näher zusammengedrückt.

In der Tabelle C liegt für die Werte als der Arbeit von Tauber der zahlenmäßige Mittelpunkt sowohl für die Anzahl der Geburten, als auch für die prozentuale Verteilung der reifen Kinder am Ende des 9. Monats und bei Kühnemann am Anfang des zehnten Monats.

Es ist also ersichtlich, daß der mittlere Geburtstermin für Zwillingsgeburten tiefer liegt als bei Einlingen und zwar in der Terminbreite von 0 bis 30. Die große Breite kann damit erklärt werden, daß die Raumenge des Mutterleibes je nach Konstitution der Gebärenden die Geburt mehr oder weniger früh veranlaßt.

Zieht man die große Zahl von 506 Fällen, die den Berechnungen zugrunde liegt, in betracht, so darf behauptet werden, daß der errechnete Wert des Geburtstermins als

Norm für Zwillingsgeburten gelten kann. Will man für die Praxis einen Mittelwert für den Geburtstermin auf den Tag festlegen, so sollte man ihn möglichst nahe dem Nullpunkte wählen. Man könnte die 7 Tage, die bei Einlingen zum ersten Tag der letzten regelmäßigen Regel hinzugezählt werden, fortlassen und für Zwillingschwangerschaften von diesem Tage an glatt drei Monate rückwärts rechnen.

Um zu einem Urteil über den Reifegrad der Zwillingsgeburten zu gelangen, muß zunächst auf die als reif bezeichneten Fälle zurückgegriffen werden. Von diesen sind in der folgenden Tabelle A

Tabelle A

Termine	L	Gewicht	K.u.	Termine	L	Gewicht	K.u.
+ 74/31	53,6	2996	36	— 6/10	49,1	3186	34,2
+ 30/26	51,5	3325	34,35	— 11/15	49,6	3090	33,4
+ 25/21	50	3450	36	— 16/20	49,2	2825	33,7
+ 20/16	50	3450	36	— 21/25	49,2	2775	33,4
+ 15/11	50,2	3193	34,8	— 26/30	48	2632	32,8
+ 10/6	50,9	2910	34,6	— 31/35	49,5	3347	33,8
+ 5/1	49,8	3176	35	— 36/40	49,5	3085	34,2
0	49	3176	34,2	— 41/45	45,5	3325	33
— 1/5	50,01	3195	34,4	— 46/50	48	2200	32,2
				— 70	48	2640	32

die größeren Kinder zusammengestellt und wie in Statistik I ihre Gruppendurchschnittswerte errechnet worden. In gleicher Weise ist die Tabelle D von allen Kindern ohne Rücksicht auf die Reife gebildet worden.

Tabelle D

Termine	Länge	Gewicht	Schädelumfang
+ ⁷⁴ / ₃₁	51	2370	35 ₃
+ ³⁰ / ₂₆	50 ₆₆	3200	34 ⁹
+ ²⁰ / ₁₆	46 ₆₆	2456	33 ₆
+ ¹⁵ / ₁₁	50 ₂₅	3190	34 ₉₁
+ ¹⁰ / ₆	49 ₇₂	2735	33 ₁
+ ⁵ / ₁	49 ₅₃	3120	34 ₁
0	49	3050	34 ₂
— ¹ / ₅	49 ₄	3215	34 ₁₄
— ⁶ / ₁₀	49 ₇₄	3031	34 ₈₅
— ¹¹ / ₁₅	49	3007	33 ₅
— ¹⁶ / ₂₀	48	2693	33 ₂₃
— ²¹ / ₂₅	47 ₇₅	2563	32 ₆
— ²⁶ / ₃₀	46 ₈₅	2355	32 ₆₅
— ³¹ / ₃₅	47 ₂	2480	42 ₅₈

Für die Terminbreite von 0 bis —30, die als mittlerer Geburtstermin für Zwillingsgeburten gefunden wurde, ergeben sich für die Länge, das Gewicht und den Kopfumfang aus den Tabellen A und D und für die größeren Kinder der Statistik II folgende Werte:

	Länge in cm	Gewicht in g	Kopfumfang in cm
A	49,1	2981	34,4
D	48,4	2830	33,45
Stat. II	49,1	2892	34

Aus dieser Aufstellung ersieht man, daß die größeren Kinder in der Länge um 1 cm, im Gewicht um 350 g gegen Einlinge zurückbleiben, daß sie ihnen aber im Schädelumfang vollständig gleichkommen. In der Kartothek erreicht

nur in 29,5⁰/₀ aller Fälle das größere Kind die Länge 49 cm. Stellt man in der Tabelle A die Gruppen zwischen den Terminen —30 bis —70 zusammen, um aus ihnen einen unteren Grenzwert für die Länge zu finden, so ergibt sich ein Durchschnittswert von 48 cm. Dieser Wert, der demjenigen für Einlinge entspricht wird nur in 36⁰/₀ der Fälle vom größeren Kind erreicht. Wir müßten aber zu einem tieferen unteren Grenzwert kommen, der von mehr Kindern erreicht wird. Nehmen wir 47 cm dafür an, so würde dieses Maß schon von 49,4⁰/₀ der Fälle erreicht werden.

Bei den bisherigen Berechnungen sind, wie allgemein üblich, zur Bestimmung des Reifegrades nur die größeren Kinder herangezogen worden. Die Folge davon ist, daß nach den oben gefundenen mittleren und unteren Normwerten nur ein geringer ⁰/₀ Satz aller Zwillinge als reif erklärt werden kann. Die Erfahrung lehrt jedoch, daß Zwillingskinder, die diese Normwerte nicht erreichen, lebensfähig sind, oft sogar lebensfähiger als Einlinge mit größeren Maßen. Auch werden in den bearbeiteten Krankenblättern oft Zwillinge als reif bezeichnet, die nach der üblichen Reifebeurteilung als unreif bezeichnet werden müßten. Stellen wir die Berechnungen auf noch breitere Grundlage, indem wir den Mittelwert beider Zwillingskinder zugrunde legen, so kommen wir zu wesentlich anderen Normwerten.

Zu solch niedrigen Werten ist schon Lüdi gekommen, weshalb seine Ergebnisse zum Vergleiche bei den folgenden Berechnungen herangezogen werden sollen. Er gibt folgende Werte an:

Tabelle B

Termine	Länge	Gewicht	Termine	Länge	Gewicht
+ 20/11	48,05	2697	— 11/20	44,9	2281
+ 10/1	48,85	2850	— 21/30	45,4	2291
1/10	46,9	2527	— 31/40	43,3	1935

Unter Zugrundelegung der Mittelwerte beider Zwillinge ergeben sich für die Terminbreite 0 bis —30 aus den Statistiken I und II und der Tabelle C folgende Werte:

Statistik III

Termine	Geschlecht	Länge	Gewicht d. lebenden Kindes	Schädel-umfang	reif	Geschlecht	Länge	Gewicht d. II. Kindes	Schädel-umfang	reif	Angaben der Reife	unreif
+ 13	+ o	52	3620	38	+	+ o	46	2540	34		bis auf L und G +	
+ 8	+ o	50	3030	33s			48	2050	33		nicht alle vorhanden	
+ 3	+ o	49	2900	33			49	2800	34		bis auf L und G +	
+ 1	+ o	50	3250	37	+		48	2250	35		bis auf L und G +	
- 1	+ o	46	2600	33s			47	2260	31		in mäßigem Grade vorhanden	
- 2	+ o	47	2710	33			46	2360	32		nicht reif	
- 2	+ o	47	2450	32s			48	2820	35s		nicht reif	
- 12	+ o	48	2800	34			48	2720	34		teilweise vorhanden	
- 12	+ o	51	3250	34	+		49	2690	32	+	bis auf L und G +	
- 13	+ o	47	2720	33			49	3400	34		bis auf L und G	
- 13	+ o	50	3050	33s	+		47	2220	32		nicht ganz +	
- 19	+ o	48	2700	33	tot		48	2690	33s		nicht sämtlich vorhanden	
- 20	+ o	49	3100	33	+		48	2250	33		unreif	
- 20	+ o	47	2510	34			51	3230	34		nicht reif	
- 20	+ o	48	3000	36	+		49	3680	34		teilweise nicht reif	
- 20	+ o	46s	2700	33			46	2360	32s		unreif	
- 20	+ o	46	2680	34s			48	2700	32		nur teilweise vorhanden	
- 21	+ o	47	2220	32			48	2390	34		nicht ganz reif	
- 22	+ o	47	2280	33			50	2750	34		nicht reif	
- 23	+ o	46	2500	33			47	2600	34	+	unreif	
- 24	+ o	47	2820	34			48	2900	32s	+	unreif	
- 24	+ o	47	2390	34s			50	2850	34		bis auf L und G	
- 25	+ o	47	2390	33s			48	2500	31s		nicht vollständig vorhanden	
- 27	+ o	47	2380	35			48	2590	35		nicht reif	
- 28	+ o	47	2850	32			48s	2500	30s		bis auf L und G	
- 28	+ o	50	3000	35	+		47	2550	35		bis auf L und G +	
- 28	+ o	47	2270	32s	tot		48	2670	33s	+	unreif [?]	
- 33	+ o	47	2830	30s			46	2480	32s		nur teilweise	
- 39	+ o	47s	2190	30			47	2250	31s		fehlen zum Teil	
- 46	+ o	50	2800	33	+		48	2640	33		bis auf L und G	
- 55	+ o	47	2330	33s	tot		46	2190	32s	tot	nicht sämtlich vorhanden	



	Länge in cm	Gewicht in g	Kopfumfang in cm
Stat. I	48,33	2828	33,96
Stat. II	48,33	2754	34,75
Tab. C	47,73	2695	—
(Lüdi	46,8	2668	—)

Die mittleren Durchschnittswerte betragen also 48 cm Länge, 2750 g Gewicht und 34 cm Kopfumfang und werden erreicht in der Länge von 34,8 %₀, im Gewicht von 30 %₀ aller 338 Fälle gegen 29 %₀ bzw. 16,5 %₀ nach den vorher nur für die größeren Kinder errechneten Mittelwerten.

Um zu einem unteren Werte zu kommen, sollen die Durchschnittswerte der Gruppen —26 30 und —31,35 benutzt werden, die an der unteren Grenze des mittleren Geburtstermins 0 bis —30 liegen. Es ergeben sich folgende Werte:

	Länge in cm	Gewicht in g	Kopfumfang in cm
Stat. I	46,03	2327	32,12
Stat. II	46,12	2542	32,07
(Lüdi	44	2000)	

Die mittleren Durchschnittswerte für die untere Grenze betragen also: 46,07 cm Länge, 2434 g Gewicht und 32,09 cm Kopfumfang. Diese Länge wird von 55,8 %₀ gegen vorher 49 %₀ der größeren Kinder erreicht.

Zur Bestimmung einer oberen Grenze ist aus jeder der 13 Gruppen von 74 bis 30 das Zwillingsspaar mit den größten Mittelwerten ausgewählt worden, und es wurden von ihnen folgende Durchschnittswerte errechnet: 51,58 cm Länge und 3650 g Gewicht. Diese oberen Grenzwerte werden von 3,5 %₀ aller Fälle erreicht und stimmen mit den oberen Grenzwerten für Einlinge fast überein. Die beiden Fälle mit den größten Mittelwerten hatten folgende Maße:
 erster Fall: 53,5 cm, 3835 g und 36 cm,
 zweiter Fall: 53 cm, 4005 g und 36 cm.

In der Statistik III sind die 31 Fälle, bei denen die Reife eindeutig ausgesprochen ist, gesondert zusammengestellt worden. Nach den zuletzt gefundenen unteren Grenzwerten könnten alle als reif bezeichnet werden.

In der Kartothek finden sich weitere 18 Fälle mit unreif bezeichneten Kindern, die ebenfalls nach den zuletzt gefundenen unteren Grenzwerten noch als reif bezeichnet werden könnten und in der Statistik I als „neureif“ angeführt wurden. Bei Anwendung der zuletzt gefundenen unteren Grenzwerte würde sich die Zahl der als reif zu bezeichnenden Kinder aller 338 Geburten von 33,4⁰/₀ auf 55,8⁰/₀ erhöhen.

Vergleicht man die Kopfmaße in den verschiedenen Gruppen der Statistik I und II mit den Normwerten bei Einlingen, so ergibt sich die auffällige Tatsache, daß der Kopfumfang bei Zwillingen fast immer demjenigen der Einlinge gleichkommt, während der gerade -- und die queren Kopfdurchmesser nur in einzelnen Fällen erreicht werden.

Zum Schluß soll eine Tabelle folgen, die einen Vergleich zwischen dem Wachstum von Zwillingen und Einlingen in der Zeit vom 4. bis 9. Schwangerschaftsmonat zuläßt. In ihr sind, unter Mitbenutzung von Angaben aus dem Stoeckelschen¹³⁾ Lehrbuch Länge und Gewicht von Einlingen und die entsprechenden Mittelwerte für Zwillinge neben einander gestellt. Die Tabelle zeigt, daß vom 4. bis 8. Monat die Maße der Zwillinge größer sind als bei Einlingen, und daß erst im 9. Monat die Einlinge die Zwillinge übertreffen.

Angaben nach Stoeckel¹³⁾ Werte der Stat. I.

Monat	Termine	Länge	Ge- wicht	Länge	Ge- wicht
9	26/30	45	2000—2500	47,77	2306
8	56/60	40	1500—1600	41	1577
6 3/4	91/95	35	750—1000	38,25	1132
6	111/115	30	600—700	33,1	736
5	141/145	25	300		
4	166/170	16		17,5	

7 Drillingsgeburten.

Stand	Alter Jahre	Para	Ge- schlecht	Länge	Ge- wicht	Um- fang	Schädeldurchmesser			Ter- mine
							gerader	I. quer	II. quer	
Frau	29	II	 + + +	46	2310	32	10	7	6	alle 3 tot
				44	2320	31 ₅	9 ₅	7 ₅	6	
				50	2600	32	9 ₅	8	6 ₅	
Frl.	20	I	 + + +	39	1260	28	10 ₇₅	8 ₅	7 ₅	+ 4
				37	1050	27 ₅	10 ₅	8 ₅	7	
				38	1180	27	10	8 ₅	7 ₂₅	
Frau		III	 + + +		2250					0
					2800					
					2250					
Frau	31	II	 + + +	45	2300	33	11	8	7	— 34
				53+	2130	30	10	8	7	
				43+	2170	32	10	8	7	
Frl.	34	I	 + + +	39	1390	30	9 ₅	8	6	42
				45	2030	33	10 ₅	8 ₅	6 ₅	
				38	1180	28	9 ₅	7	6	
Frl.	26	I	 + + +	44	1740	30	10	9 ₅	6 ₅	82
				44	1900	33	11	8 ₅	6 ₅	
				45	1680	28	11	8	6 ₅	
Frl.	30	I	 + + + 	31	800	tot				— 107
				31	900	tot				
				31	800	tor				

Zusammenfassung.

1. Die Dauer von Zwillingsschwangerschaften ist im allgemeinen kürzer als die der Einlinge.

2. Das Ende der Zwillingsschwangerschaften liegt am häufigsten innerhalb des 240. und 270. Tages der Schwangerschaft, vom 1. Tag der letzten regelmäßigen Regel an gerechnet.

3. Für den praktischen Gebrauch zur Errechnung des Geburtstermins wird vorgeschlagen, vom 1. Tag der regelmäßigen Regel volle drei Monate abzuziehen,

4. Die Normwerte für die Länge und das Gewicht sind bei reifen Zwillingsskiadern kleiner als bei Einlingen.

5. Sie ergeben unter Zugrundelegung der größeren Zwillinge einen Mittelwert von 49 cm Länge, von 2950 g Gewicht und einen unteren Wert von 48 cm Länge und 2930 g Gewicht. Diese Werte werden von nur 36⁰/₁₀₀ aller Geburten erreicht.

6. Unter Zugrundelegung des Mittelwertes beider Zwillinge ergibt sich ein oberer Wert von 51,58 cm Länge und 3650 g Gewicht, ein mittlerer Wert von 48 cm Länge und 2750 g Gewicht und ein unterer Wert von 46,07 cm Länge und 2434 g Gewicht. Diese Werte werden von 55,8⁰/₁₀₀ aller Geburten erreicht.

7. Für die Praxis empfiehlt es sich, den Mittelwert beider Zwillinge als Formel zu wählen und die Zwillinge als reif zu erklären, wenn die unteren Grenzwerte 46 cm Länge und 2400 g Gewicht erreicht sind.

8. Bei den Kopfmaßen hat sich die auffällige Tatsache ergeben, daß der Kopfumfang fast immer demjenigen der Einlinge gleichkommt, während die bei Einlingen geltenden Maße für Kopfdurchmesser nur selten erreicht werden.

Bei der Bearbeitung des Themas unter Zugrundelegung der Zwillingsgeburten an der Universitäts-Frauenklinik zu Königsberg Pr. von 1910—1932 war es unser Wunsch, ein auf möglichst einen Tag festgelegtes Optimum des Schwangerschaftsendes für Zwillinge zu finden und für diesen Zeitpunkt die geltenden optimalen Werte der Länge und des Gewichtes der Zwillinge zu errechnen.

Da viele Fälle mit ungenauen Angaben verarbeitet wurden, da das Optimum des Schwangerschaftsendes sich über den ganzen 10. Monat ausdehnt und da die Gesamtzahl der Fälle nur 364 beträgt, so kämen wir auf Grund der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu unzulänglichen Ergebnissen.

Es wäre leicht möglich, daß unter Zugrundelegung von mehr Fällen aus anderen Kliniken sich beträchtlich andere Werte ergeben könnten.

Für Einlinge hat Zangemeister¹⁾ Material von ca. 3000 Fällen zusammengetragen und daraus die Werte für

die Schwangerschaftsdauer, die Länge und das Gewicht des Kindes errechnet. Da bei unsern 364 Zwillingen das Optimum des Schwangerschaftsendes sich über den ganzen 10. Monat ziemlich gleichmäßig verteilt, so müßte für Zwillinge sogar ein noch größeres Material gesammelt werden, um zu einem genauen Resultat zu kommen.

Die Ergebnisse dieser Arbeit können also noch nicht als endgültig betrachtet werden.

Für die freundliche Ueberlassung des Themas und des Materials möchte ich mir an dieser Stelle ganz geziemend erlauben, meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Professor F. v. Mikulicz-Radecki, meinen ergebensten Dank auszusprechen.



Literatur.

1. Centralbl. d. Gyn. Nr. 6, Jg. 56, aus der Kanton-Krankenanstalt Aarau, Priv. Doz. Dr. Hüsing.
2. Arch. f. Gyn. 1917. S. 107. Zangemeister, Schwangerschaftsdauer und Fruchtentwicklung, und Bericht über die ges. Gyn. und Geburtsh. Bd. 24/1933, S. 227. Entwicklungszustand des Neugeborenen und Vaterschaftsfragen von Hermann Dörfler.
3. Halban-Seitz: Biologie und Pathologie des Weibes, VI. Buch, Bd. 1. S. 172.
4. Halban-Seitz:
5. Halban-Seitz: VI. Buch, Bd. 2, S. 960.
6. Halban-Seitz: VI. Buch, Bd. 1, S. 230.
7. Halban-Seitz: VI. Buch, Bd. 2, S. 961.
8. Halban-Seitz: VI. Buch, Bd. 2, S. 230.
9. Berichte über d. ges. Gyn. u. Geburtsh. Bd. 12, S. 644, Liebmann, Isvan, Ueber 157 Zwillingsgeburten.
10. dto. Bd. 18, 1930. S. 688. Essen-Moeller, Univ. Frauenklinik Lund, Ueber die Aehnlichkeit bei Zwillingspaaren.
11. Hans Tauber: Jena 1916. Inaug. Diss., Ueber 100 Fälle von Zwillingschwangerschaften und Geburten.
12. Arthur Kühnemann, 1910, Die Zwillingsgeburten der Bonner Geburtshilf. Klinik. Inaug. Diss.
13. Stoeckel: Lehrbuch der Geburtshilfe, S. 71—74.

Introduction

The purpose of this study is to investigate the effects of various factors on the growth and development of the human body. The study is based on a series of experiments conducted over a period of six months. The results of the study are presented in the following sections.

The first section discusses the methods used in the study. The second section presents the results of the experiments. The third section discusses the implications of the findings. The fourth section concludes the study.

The study was conducted in a laboratory setting. The subjects were a group of young adults. The experiments were designed to measure the effects of different diets, exercise regimens, and environmental factors on the growth and development of the body.

The results of the study show that there are significant differences in the growth and development of the body depending on the factors studied. The findings have important implications for the understanding of human growth and development.

The study was supported by the National Institutes of Health. The authors would like to thank the staff of the laboratory for their assistance during the study.

Lebenslauf.

Ich, Wilhelm, Max Dieke wurde als Sohn des Oberschullehrers Max Dieke und seiner Ehefrau Elisabeth, geb. Müller, am 23. Juli 1910 in Schivelbein geboren. Dort besuchte ich vom 5. Lebensjahr an 3 Jahre die Vorschule und ging dann 6 Jahre auf der ehemaligen Landwirtschaftsschule zu Schivelbein zur Schule. Meine 3 letzten Schuljahre war ich auf der Oberrealschule in Köslin und erhielt dort Ostern 1928 das Zeugnis der Reife.

Meinem lang gehegten Wunsche gemäß durfte ich Medizin studieren. So war ich zunächst je 1 Semester in Königsberg Pr., Leipzig und Innsbruck, dann 1 Jahr in Kiel, wo ich das Physikum am 1. August 1930 bestand. Das erste klinische Semester war ich in Berlin. Seit Ostern 1931 studierte ich bis zur Prüfung an der hiesigen Albertus-Universität. Die Prüfung bestand ich vor der hiesigen Prüfungskommission am 2. Februar 1934. In meinem praktischen Jahr war ich bei Herrn Prof. Kaiserling im Pathologischen Institut der Universität und bei Herrn Prof. Joachim im Krankenhaus der Barmherzigkeit in Königsberg Pr. tätig.

